

วงจรชีวิตหนอนผีเสื้อหนามกะทกรก

FB: @TheVeryHungryCaterpillarHouse

The Tawny Coster
(*Acraea violae Fabricius, 1775*)

ผีเสื้อกลางวัน

ไข่
ระยะ 7-10 วัน
เมื่อหนอนฟักออกจากไข่ จะ
กินเปลือกไข่เป็นอาหารมื้อแรก



หนอน
ระยะ 10-25 วัน


ระยะนี้หนอนเปลี่ยนพืชอาหารบ่อยๆ โดยใส่
กิ่งใหม่ลงไปในกลุ่มเลี้ยงได้เลยนะคะ ไม่
ต้องดึงหนอนออกจากกิ่งเดิม เค้าจะคลานไป
หากิ่งใหม่เอง แล้วค่อยเอากิ่งเดิมออก ถ้าอ
ย่ะก็เท้อออกจากกลุ่มได้เลยค่ะ ระวังมี
หนอนติดออกไปด้วยนะคะ หนอนระยะ
สุดท้ายเจริญเต็มที่จะหยุดกินใบพืช ชักใย
ติดกิ่งไม้ 1 จุดด้านบน หลังจากนั้น
จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นดักแด้

ดักแด้
ระยะ 6-11 วัน

ระยะนี้หนอนจะหยุดกินอาหารแล้ว
เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ถ้าทุกตัว
เข้าดักแด้แล้ว สามารถเอาพืชอาหารที่
เหลือ และเท้อทิ้งได้เลยค่ะ ระยะนี้ไม่ต้อง
ทำอะไรแล้วค่ะ รอระยะเวลาให้เค้าออก
จากผีเสื้อเท่านั้นค่ะ มารอลุ้นนะคะว่าจะได้
ลูกสาวหรือลูกชาย 😊



ผีเสื้อ
ระยะ 10-15 วัน



ตัวผู้จะมีสีเข้มกว่าตัวเมีย

ตอนที่ผีเสื้อออกจากดักแด้ประมาณ 1-
2 ชั่วโมง อย่าเพิ่งจับผีเสื้อนะคะ ปีก
เค้าจะยังเปียกอยู่ ให้เค้าตากปีก และอ
ย่ะก็ออกมาก่อน จะมีของเหลวไหล
ออกมาในกลุ่ม เค้าจะเกาะอยู่หนึ่ง
เพื่อตากปีกให้แห้ง บันทึบนี้น่าสนใจ
มาก ถ้าไปจับโดนปีกเค้าตอนนี้ปีกจะ
หัก เสียหาย และทำให้เค้าบินไม่ได้
โอกาสเสียชีวิตสูงค่ะ หลังจากรอ 1-2
ชั่วโมงแล้วเปิดฝากล่องแล้วเอาน้ำแหย
ไปใกล้ๆ ตัวเค้าให้เค้าเกาะได้เลยค่ะ
หลังจากนั้นก็ปล่อยเค้าออกไปตาม
ธรรมชาติได้เลยค่ะ อย่าพยายามเลี้ยง
นะคะ เพราะอาจตายได้ค่ะ

ปล. สงสัยขั้นตอนไหน Add Line ID: aey_natchamon สอบถามได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับการเลี้ยงนะคะ
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆ ค่ะ